

## CALENDRIER RÉGULIER D'IMMUNISATION DU NUNAVIK (MAJ 2023-08-10)

Âge	Vaccins						Noms commerciaux (À titre indicatif – sujet à changement)
1 mois	BCG <sup>(1)</sup>						BCG Japan
2 mois	DCaT	HB	VPI	Hib	Pneu-C-10	Rota <sup>(2)</sup>	Infanrix hexa / Synflorix / RotaTeq ou Rotarix
4 mois	DCaT	HB	VPI	Hib	Pneu-C-10	Rota <sup>(2)</sup>	Infanrix hexa / Synflorix / RotaTeq ou Rotarix
6 mois <sup>(3)</sup>	Pneu-C-10					Influenza <sup>(7)</sup>	Synflorix
1 an <sup>(4)</sup>	DCaT	VPI	Hib	RRO-Var	Pneu-C-13	Influenza <sup>(7)</sup>	Pediacel / Proquad / Pevnar13
18 mois	HAHB	Men-C-C	RRO-Var			Influenza <sup>(7)</sup>	Twinrix Jr / Neisvac-C ou Menjugate / Proquad
4 à 6 ans	dcaT	VPI	Var <i>Si n'a pas reçu 2 doses de Var antérieurement</i>		+ mise à jour du statut vaccinal	Influenza <sup>(7)</sup> HA <sup>(11)</sup>	Adacel-Polio ou Boostrix-Polio / +/- Varivax si n'a pas reçu 2 doses de Var antérieurement.
4 <sup>e</sup> année (9-10 ans)	VPH-9	HA				Influenza <sup>(7)</sup>	Gardasil 9 / Havrix (720 U) ou Vaqta (25 U)
7 <sup>e</sup> année <sup>(5)</sup>	VPH-2	HB	Men-C- ACWY <sup>(6)</sup>	dT	+ mise à jour du statut vaccinal	Influenza <sup>(7)</sup> HA <sup>(11)</sup>	Cervarix / Engerix B (0,5 mL) / Nimenrix / dT adsorbées
Femme enceinte	dcaT <sup>(8)</sup>					Influenza <sup>(7)</sup> HA <sup>(11)</sup>	Adacel ou Boostrix
50 ans	dT <sup>(9)</sup>	Pneu-C-20 <sup>(10)</sup>			+ mise à jour du statut vaccinal	Influenza <sup>(7)</sup> HA <sup>(11)</sup>	dT adsorbées / Pevnar20
80 ans	Zona-SU <sup>(12)</sup>					Influenza <sup>(7)</sup>	Shingrix

### Notes:

- Administrer le BCG aux nourrissons du Nunavik si résultat négatif au dépistage du DICS.
- La vaccination contre le rotavirus doit être débutée avant l'âge de 20 semaines et complétée avant l'âge de 8 mois. Pour les enfants immunodéprimés ou susceptibles de l'être, les enfants avec antécédents d'invagination intestinale ou ceux présentant des symptômes de gastroentérites aiguës : référer au PIQ.
- Une dose additionnelle de DCaT-VPI-Hib est administrée à 6 mois pour les enfants immunodéprimés, prématurés (< 32 semaines), de très faible poids de naissance (<1500g), présentant une asplénie anatomique ou fonctionnelle ou un implant cochléaire (Voir PIQ).
- Administrer DCaT-VPI-Hib, Pneu-C-13, RRO-Var le jour du 1<sup>er</sup> anniversaire ou le plus tôt possible après ce jour.
- Les vaccins prévus en 3<sup>ième</sup> secondaire dans le PIQ sont donnés en 7<sup>ième</sup> année au Nunavik.
- Omettre cette dose si 1 dose de Men-C-ACWY a été administrée à l'âge de 10 ans ou plus.
- Le vaccin contre l'influenza est recommandé annuellement durant la saison grippale à toute personne vivant dans les communautés éloignées/ isolées, dès l'âge de 6 mois. Chez l'enfant âgé de moins de 9 ans, 2 doses sont requises à 4 semaines d'intervalle s'il s'agit de la 1<sup>ère</sup> année où l'enfant reçoit le vaccin contre la grippe.
- Vacciner les femmes enceintes contre la coqueluche à chaque grossesse, peu importe les antécédents vaccinaux. Vacciner de préférence entre 26 et 32 semaines de gestation.
- Omettre cette dose si une dose de dT a été administrée depuis l'âge de 40 ans.

- Administrer 1 dose de vaccin Pneu-C-20 aux personnes âgées de 50 ans et plus vivant au Nunavik. Un intervalle minimal d'un an doit être respecté entre tout vaccin Pneu-C ou Pneu-P et l'administration du Pneu-C-20.
- Au Nunavik, la vaccination contre l'hépatite A est recommandée pour toute personne de 18 mois et plus non-adéquatement protégée. Compléter la vaccination si nécessaire (1 dose du composant HA est requise pour les personnes vaccinées entre 1 an et 19 ans OU 2 doses si la personne est vaccinée à ≥ 20 ans, à un intervalle recommandé de 6 à 12 mois).
- Le calendrier recommandé pour la vaccination contre le zona comprend 2 doses, données à un intervalle recommandé de 2 à 12 mois.

**ATTENTION!** Ce calendrier n'inclut pas les recommandations spécifiques s'adressant à une clientèle immunodéprimée, asplénique, vivant avec des conditions médicales ou facteur(s) de risque particulier(s) (ex : maladies chroniques, itinérance, utilisation de drogues dures, harsah, etc.). Vous devez vous référer au PIQ pour des recommandations vaccinales adaptées à cette clientèle et suivre les calendriers spécifiques lorsque applicable (ex : calendrier à 3 doses pour les vaccins contre les VPH, hépatites A et B).

### Liens utiles :

- <https://www.msss.gov.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-calendriers-de-vaccination/autres-vaccins-recommandes/>
- Vaccins contre le pneumocoque : <https://msss.gov.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/tableau-synthese-pour-l-utilisation-des-vaccins-contre-le-pneumocoque/>