

CALENDRIER RÉGULIER D'IMMUNISATION DU NUNAVIK (MAJ 2025-03-04)

Âge	Antigènes à administrer				Produits immunisants suggérés, Par noms commerciaux et leurs équivalents	
À la naissance	Ac-VRS* (1)				Nirsévimab (Beyfortus)	
1 mois	BCG (2)				BCG Japan	
2 mois	DCaT- HB - VPI - Hib	Pneu-C 20(3)		Rota (4)	Infanrix hexa / Prevnar20 / RotaTeq ou Rotarix	
4 mois	DCaT- HB - VPI - Hib	Pneu-C-20(3)		Rota (4)	Infanrix hexa / Prevnar20 / RotaTeq ou Rotarix	
6 mois (5 - 6)		Pneu-C-20 (3)		Influenza (7)	Prevnar20	
1 an (8)	DCaT -VPI - Hib	Pneu-C-20 (3)		RRO-Var Influenza (7)	Pediacel ou Pentacel / Prevnar20 / Proquad ou Priorix-Tetra	
18 mois	HA-HB	Men-C-C		RRO-Var Influenza (7)	Twinrix Jr / Neisvac-C ou Menjugate / Proquad ou Priorix-Tetra	
4 à 6 ans	dcaT - VPI	Var <i>Si n'a pas reçu 2 doses de Var antérieurement</i>		+ mise à jour du statut vaccinal Influenza (7) HA (9)	Adacel-Polio ou Boostrix-Polio / +/- Varivax	
4 ^e année	VPH-9	HA(9)		Influenza (7)	Gardasil 9 / Havrix (720 U) ou Vaqta (25 U)	
7 ^e année (10)	dT(11)	HB(12)	Men-C-ACWY (13)	+ mise à jour du statut vaccinal Influenza (7) HA (9)	dT adsorbées / Engerix B (0,5 mL) ou Recombivax HB (0,5 mL) / Nimenrix	
Femme enceinte	dcaT(14)			Influenza (7) HA (9)	Adacel ou Boostrix	
50 ans (15)	dT (11 - 16)		Pneu-C-20(17)	+ mise à jour du statut vaccinal Influenza (7) HA (9)	dT adsorbées / Prevnar20	
75 ans	Zona-SU (18)			Influenza (7)	Shingrix	

Notes:

*Bien que l'Ac-VRS ne soit pas un vaccin, il est inclus dans le calendrier régulier de vaccination des nourrissons.

1. Anticorps monoclonal à administrer le plus tôt possible après la naissance (en saison du VRS).
2. Administrer le BCG aux enfants de moins de 24 mois du Nunavik si résultat négatif au dépistage du DICS.
3. Au Nunavik, le Pneu-C-20 est le vaccin disponible pour l'immunisation régulière des enfants. Tel que mentionné au PIQ, le vaccin Pneu-C-20 peut être utilisé si le Pneu-C-15 n'est pas disponible.
4. La vaccination contre le rotavirus doit être débutée avant l'âge de 20 semaines et complétée avant l'âge de 8 mois. Pour les enfants immunodéprimés ou susceptibles de l'être, les enfants avec antécédents d'invagination intestinale ou ceux présentant des symptômes de gastroentérites aigues : référer au PIQ.
5. Une dose additionnelle de DCaT-VPI-Hib est administrée à 6 mois pour les enfants immunodéprimés, prématurés (< 32 semaines), de très faible poids de naissance (<1500g), présentant une asplénie anatomique ou fonctionnelle ou un implant cochléaire (Voir PIQ).
6. Une dose additionnelle de Pneu-C-20 est offerte à 6 mois au Nunavik.
7. Le vaccin contre l'influenza est recommandé annuellement durant la saison grippale à toute personne vivant dans les communautés éloignées/ isolées, dès l'âge de 6 mois. Chez l'enfant de moins de 9 ans, 2 doses sont requises à 4 semaines d'intervalle s'il s'agit de la 1^{ère} année où l'enfant reçoit le vaccin.
8. Administrer DCaT-VPI-Hib, Pneu-C-20, RRO-Var le jour du 1^{er} anniversaire ou le plus tôt possible après.
9. Au Nunavik, la vaccination contre l'hépatite A est recommandée pour toute personne de 18 mois et plus non adéquatement protégée. Compléter la vaccination si nécessaire (Pour être considéré adéquatement protégée, 1 dose du composant HA est requise pour les personnes vaccinées entre 1 an et 19 ans OU 2 doses si la personne est vaccinée à ≥ 20 ans, à un intervalle recommandé de 6 à 12 mois). Pour la dose prévue en 4^{ème} année, celle-ci peut être omise si au moins 1 dose de vaccin contre l'HA a été reçue depuis l'âge de 1 an.

10. Les vaccins prévus en 3^{ème} secondaire dans le PIQ sont donnés en 7^{ème} année au Nunavik.

11. Si le vaccin dT n'est pas disponible, il est possible d'utiliser le vaccin dcaT, même si la composante coqueluche n'est pas requise pour la protection.

12. Omettre cette dose si 2 doses de HB ont été reçues après l'âge de 1 an ou 3 doses au total depuis la naissance, en respectant les intervalles minimaux recommandés selon le PIQ.
13. Omettre cette dose si 1 dose de Men-C-ACWY a été administrée à l'âge de 10 ans ou plus.
14. Vacciner les femmes enceintes contre la coqueluche à chaque grossesse, peu importe les antécédents vaccinaux. Vacciner de préférence entre 26 et 32 semaines de gestation.
15. Les frais de vaccination contre le zona sont couverts par le programme SSNA pour les personnes âgées de 50 à 75 ans ET bénéficiaires de la CBJNQ, selon critères du programme.
16. Omettre cette dose si une dose de dT a été administrée depuis l'âge de 40 ans.
17. Administrer 1 dose de vaccin Pneu-C-20 aux personnes de 50 ans et plus vivant au Nunavik. Un intervalle minimal d'un an doit être respecté entre tout vaccin Pneu-C ou Pneu-P et l'administration du Pneu-C-20.
18. Le calendrier recommandé pour la vaccination contre le zona comprend 2 doses, données à un intervalle recommandé de 2 à 12 mois.

ATTENTION! Ce calendrier n'inclut pas les recommandations spécifiques s'adressant à une clientèle immunodéprimée, asplénique, vivant avec des conditions médicales ou facteur(s) de risque particulier(s) (ex : maladies chroniques, itinérance, utilisation de drogues dures, harsah, etc.). Vous devez vous référer au PIQ pour des recommandations vaccinales adaptées à cette clientèle et suivre les calendriers spécifiques lorsque applicable.