Tableau résumé du nombre de doses de vaccin contre la COVID-19 (applicable au Nunavik)

Le tableau suivant présente les recommandations du Comité d'immunisation du Québec (CIQ) concernant les doses de vaccin contre la COVID-19 autorisées au Canada1 qui sont nécessaires pour développer une réponse immunitaire adéquate selon l'âge de la personne, son état de santé et ses antécédents d'infection à la COVID-19. Le Protocole d'immunisation du Québec (PIQ) demeure l'outil de référence en matière de vaccination. Il doit être consulté pour de plus amples détails.

		VACCINATION DE BASE		DOSE DE RAPPEL HIVER-PRINTEMPS 2023[3-4]	
Âge	**Condition (état de santé)**	**Sans antécédent d'infection au SRAS-CoV-2**	**Avec antécédent d'une ou de plusieurs infections au SRAS-CoV-2[2]**	**Sans antécédent d'infection au SRAS-CoV-2**	**Avec antécédent d'une ou de plusieurs infections au SRAS-CoV-2[2]**
6 mois à 4 ans	Immunodépression ou dialyse	Primo 3 ou 4 doses[5]	Primo 3 ou 4 doses[5]	Non	Non
	Tous les autres	Primo 2 ou 3 doses[5]	Primo 1 ou 2 doses[5-6]	Non	Non
5 à 11 ans	Immunodépression ou dialyse	Primo 3 doses + 1 rappel	Primo 3 doses + 1 rappel	Recommandée[3]	Recommandée[3]
	Autres conditions à risque élevé de complications	Primo 2 doses + 1 rappel	Primo 1 dose + 1 rappel	Recommandée[3]	Autorisée[4]
	Tous les autres	Primo 2 doses[7]	Primo 1 dose[6-7]	Autorisée[4]	Autorisée[4]
12 à 17 ans	Immunodépression ou dialyse	Primo 3 doses + 1 rappel	Primo 3 doses + 1 rappel	Recommandée[3]	Recommandée[3]
	Autres conditions à risque élevé de complications	Primo 2 doses + 1 rappel	Primo 1 dose + 1 rappel	Recommandée[3]	Autorisée[4]
	Vivant dans un milieu collectif	Primo 2 doses + 1 rappel	Primo 1 dose + 1 rappel	Autorisée[4]	Autorisée[4]
	Tous les autres	Primo 2 doses[7]	Primo 1 dose[6-7]	Autorisée[4]	Autorisée[4]
18 ans et plus	Immunodépression ou dialyse	Primo 3 doses + 1 rappel	Primo 3 doses + 1 rappel	Recommandée[3]	Recommandée[3]
	Certains groupes à risque élevé de complications, **incluant tous les adultes vivant au Nunavik** et autres groupes à risque élevé de complications[8].	Primo 2 doses + 1 rappel	Primo 1 dose + 1 rappel	Recommandée[3]	Autorisée[4]
	Tous les autres	Primo 2 doses + 1 rappel	Primo 1 dose + 1 rappel	Autorisée[4]	Autorisée[4]

[1] La primovaccination des personnes vaccinées à l'étranger doit être complétée conformément à l'outil « Recommandations pour les personnes qui ont été vaccinées contre la COVID-19 à l'étranger ». Les indications du présent document quant aux doses de rappel s'appliquent également à ces individus.

[2] Confirmée par TAAN ou par test antigénique (TDAR).

[3] Une dose de rappel est recommandée avec un vaccin bivalent aux groupes visés qui n'ont pas eu la COVID-19 et dont la dernière dose a été administrée depuis au moins six mois, quel que soit le produit préalablement utilisé. Pour les personnes immunodéprimées ou dialysées, la dose de rappel est recommandée même si elles ont déjà été infectées par le SRAS-CoV-2 (intervalle de quatre semaines ou plus après l'infection).

[4] Cette dose de rappel avec un vaccin bivalent peut être administrée aux personnes âgées de 5 ans et plus en bonne santé (avec ou sans antécédent de COVID) qui souhaitent la recevoir, au moins six mois après la dernière dose reçue ou après l'infection.

[5] Le calendrier régulier de primovaccination de Comirnaty 3 µg chez les enfants âgés de 6 mois à 4 ans comprend une dose de plus que celui du Spikevax, soit trois doses chez les enfants en bonne santé et quatre chez les enfants immunodéprimés.

[6] Chez les personnes immunocompétentes avec antécédent d'infection par le SRAS-CoV-2, il est recommandé d'administrer une dose de moins en primovaccination. Ces personnes peuvent toutefois choisir de recevoir la série vaccinale complète. Si l'infection a débuté moins de 21 jours avant la première dose ou est survenue après la première dose, la série vaccinale complète doit être administrée.

[7] Une dose de rappel peut être offerte aux personnes âgées de 5 à 17 ans en bonne santé qui en font la demande.

[8] Inclut les personnes résidant en CHSLD, en RPA ou vivant dans d'autres milieux collectifs comportant une proportion élevée de personnes aînées et vulnérables, les personnes de 60 ans et plus, les personnes à risque élevé de complications, les travailleurs de la santé, les femmes enceintes et les adultes vivant en région éloignée et isolée.