ᒪᓕᒐᕐᒥ ᐃᓗᓯᓕᓇᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ
RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK
NUNAVIK REGIONAL BOARD OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES

Vaccination contre la COVID-19 au Nunavik (MAJ 2023-11-14

Consulter le PIQ pour indications, contre-indications, précautions, calendrier d'administration et intervalles à respecter.
En tout temps, les directives contenues dans le PIQ prévalent sur ce document.

GESTION DES PERTES

Toutes les pertes de fioles non-entamées doivent être déclarées (ex : délai de conservation au réfrigérateur dépassé, fiole expirée, BCF, etc.).

Vaccins à ARNm

Pour la campagne automne-hiver 2023-2024, le CIQ recommande l'utilisation des vaccins contenant le variant XBB.1.5.

PFIZER COMIRNATY XBB.1.5		**MODERNA SPIKEVAX XBB.1.5**	
5-11 ans 10 µg/dose Capuchon BLEU - Fiole de 2 ml (6 doses)	**12 ans et plus** 30 µg/dose Capuchon GRIS - Fiole de 2 ml (6 doses)	0,10mg/ml – 25 µg (*6 mois à 11 ans*) ou 50 µg (*12 ans et plus*) Capuchon BLEU ROI - Fiole de 2,5 ml	
Posologie ***Voir le PIQ pour calendrier d'administration**			
5 à 11 ans : 0,3 ml IM	**12 ans et plus :** 0,3 ml IM	**6 mois à 11 ans :** 0,25 ml IM	**12 ans et plus :** 0,5 ml IM
Conservation			
• JAMAIS à -20°c • **Entre 2 et 8°C** : **10 semaines** (sans dépasser péremption) • **Fiole ouverte** : **ad 12 heures** (2-8°C)		• **Entre -50 et -15°C** : **ad péremption** • **Entre 2 et 8°C** : **30 jrs** (sans dépasser péremption) • **Fiole ouverte** : **ad 24 heures** (2-8°C)	
Décongélation			
• 6 heures (2-8°C) ou 30 min (T° ambiante)		• 2 heures (2-8°C) ou 45 min (T° ambiante)	
Dilution			
Sans dilution			