

CALENDRIER RÉGULIER D'IMMUNISATION DU NUNAVIK (MAJ 2022-07-05)*

Âge	Vaccins						Noms commerciaux (À titre indicatif – sujet à changement)	
Nouveau-né	BCG ⁽¹⁾						BCG Japan	
2 mois	DCaT	HB	VPI	Hib	Pneu-C-10	Rotavirus ⁽²⁾	Infanrix hexa + Synflorix + RotaTeq ou Rotarix	
4 mois	DCaT	HB	VPI	Hib	Pneu-C-10	Rotavirus ⁽²⁾	Infanrix hexa + Synflorix + RotaTeq ou Rotarix	
6 mois ⁽³⁾					Pneu-C-10 ⁽⁴⁾	Influenza ⁽¹⁰⁾	Synflorix + Fluviral ou Fluzone quadrivalent	
1 an ⁽⁵⁾	DCaT		VPI	Hib	RRO-Var	Pneu-C-13 ⁽⁴⁾	Influenza ⁽¹⁰⁾	Pediacel + Proquad + Prevnar
18 mois		HA-HB	Men-C-C		RRO-Var		Influenza ⁽¹⁰⁾	Twinrix Jr+ Neisvac-C ou Menjugate + Proquad
4 à 6 ans ⁽⁶⁾	dcaT		VPI	Var ⁽⁷⁾ Si l'enfant n'a pas déjà reçu 2 doses de composant Var antérieurement.		Influenza ⁽¹⁰⁾	Adacel-Polio ou Boostrix-Polio +/- Varivax si l'enfant n'a pas déjà reçu 2 doses antérieurement.	
4 ^e année (9-10 ans)	VPH-9 ⁽⁸⁾	HA-HB ⁽⁸⁻¹⁴⁾					Influenza ⁽¹⁰⁾	Gardasil 9 + Twinrix Jr
7 ^e année ⁽⁶⁻⁹⁾	VPH-2 ⁽⁸⁾ à compter de l'année scolaire 2022-2023	HB ⁽⁸⁻¹⁵⁾ à compter de l'année scolaire 2022-2023	Men-C-C	dT			Influenza ⁽¹⁰⁾	Neis-Vac-C ou Menjugate+ dT adsorbées <i>À compter de l'année scolaire 2022-2023 : Ajout Cervarix + Recombivax ou Engerix B</i>
Femme enceinte	dcaT ⁽¹¹⁾						Adacel ou Boostrix	
50 ans ⁽⁶⁾	dT ⁽¹²⁾						Influenza ⁽¹⁰⁾	dT Adsorbées
65 ans	Pneu-P-23 ⁽¹³⁾						Influenza ⁽¹⁰⁾	Pneumovax-23

Notes:

- Administrer le BCG aux nouveau-nés d'Inukjuak, Kangiqsujuak, Kangiqsuajujuak, Salluit, Umiujaq, Akulivik et Puvirnituq.
- La vaccination contre le rotavirus doit être entreprise avant l'âge de 20 semaines et complétée avant l'âge de 8 mois. Référer au médecin avant d'administrer le vaccin aux nourrissons immunosupprimés ou susceptibles de l'être, incluant ceux dont la mère a pris des agents biologiques au cours de la grossesse (voir PIQ).
- Une dose additionnelle de DCaT est administrée à 6 mois pour certains enfants à risque, tels que ceux présentant un état d'immunodépression, prématurés (< 32 semaines) ou ayant un très faible poids à la naissance (< 1500 g), présentant une asplénie anatomique ou fonctionnelle ou ayant un implant cochléaire (Voir PIQ).
- Au Nunavik, le calendrier vaccinal comprend une dose additionnelle de Pneu-C 10 à l'âge de 6 mois et une dose de Pneu-C 13 à l'âge d'1 an.
- Administrer DCaT-VPI-Hib + Pneu-C-13 + RRO-Var le jour du 1er anniversaire ou le plus tôt possible après ce jour.
- Mettre à jour la vaccination lors des visites prévues en maternelle (4-6ans), en 7^{ème} année et lors du rappel de dT de 50 ans
- La dose de Var de 4-6 ans n'apparaîtra plus au calendrier lorsque la cohorte des enfants nés après juin 2018 atteindra cet âge.
- Pour les jeunes immunosupprimés, utiliser les calendriers à 3 doses à compléter en 4e année pour Gardasil et Twinrix Jr (Voir PIQ).
- Les vaccins prévus en 3^{ème} secondaire selon le PIQ sont plutôt donnés en 7^{ème} année au Nunavik.
- Le vaccin est recommandé annuellement durant la saison grippale à toute personne vivant dans les communautés éloignées ou isolées, dès l'âge de 6 mois. Chez l'enfant âgé de moins de 9 ans, 2 doses sont requises à 4 semaines d'intervalle la 1^{ère} fois qu'il est vacciné contre la grippe. La 2e dose est non requise si l'enfant a reçu au moins une dose de vaccin trivalent ou quadrivalent dans le passé.
- Vacciner les femmes enceintes contre la coqueluche à chaque grossesse, peu importe ses antécédents vaccinaux et l'intervalle depuis la dernière dose. Vacciner de préférence entre 26 et 32 semaines de gestation.
- dT : aucune dose de rappel n'est nécessaire si une dose a été administrée depuis l'âge de 40 ans.
- Administrer 1 dose de vaccin aux personnes âgées de 65 ans et plus, peu importe le nombre de doses reçues avant l'âge de 65 ans, en respectant un intervalle de 5 ans depuis la dernière dose.
- Pour les enfants **nés avant le 1^{er} juin 2019**. Cette dose sera retirée du calendrier lorsque la cohorte des enfants nés après juin 2019 atteindra cet âge.
- Cette dose sera retirée du calendrier lorsque la cohorte née après avril 2013 atteindra cet âge.**

*Pour les clientèles vivant avec des conditions médicales particulières (ex : maladies chroniques, diabète, asplénie, immunodépression), référer au PIQ: <https://www.msss.gov.gc.ca/professionnels/vaccination/piq-calendriers-de-vaccination/autres-vaccins-recommandes/>