

CALENDRIER RÉGULIER D'IMMUNISATION DU NUNAVIK (MAJ 2023-02-22)

Âge	Vaccins						Noms commerciaux (À titre indicatif – sujet à changement)	
1 mois	BCG ⁽¹⁾						BCG Japan	
2 mois	DCaT	HB	VPI	Hib	Pneu-C-10	Rotavirus ⁽²⁾	Infanrix hexa / Synflorix / RotaTeq ou Rotarix	
4 mois	DCaT	HB	VPI	Hib	Pneu-C-10	Rotavirus ⁽²⁾	Infanrix hexa / Synflorix / RotaTeq ou Rotarix	
6 mois ⁽³⁾					Pneu-C-10 ⁽⁴⁾	Influenza ⁽⁹⁾	Synflorix / Fluviral ou Fluzone quadrivalent	
1 an ⁽⁵⁾	DCaT		VPI	Hib	RRO-Var	Pneu-C-13	Influenza ⁽⁹⁾	PediaceL / Proquad / Prevnar13
18 mois		HA-HB	Men-C-C		RRO-Var		Influenza ⁽⁹⁾	Twinrix Jr / Neisvac-C ou Menjugate / Proquad
4 à 6 ans ⁽⁶⁾	dcaT		VPI		Var ⁽⁷⁾ Si l'enfant n'a pas déjà reçu 2 doses de composant Var antérieurement.	Influenza ⁽⁹⁾ HA ⁽¹³⁾	Adacel-Polio ou Boostrix-Polio / +/- Varivax si l'enfant n'a pas déjà reçu 2 doses antérieurement.	
4 ^e année (9-10 ans)	VPH-9 ⁽⁷⁾	HA-HB ⁽⁷⁾				Influenza ⁽⁹⁾ HA ⁽¹³⁾	Gardasil 9 / Twinrix Jr	
7 ^e année ⁽⁶⁻⁸⁾	VPH-2 ⁽⁷⁾	HB ⁽⁷⁾	Men-C-C	dT		Influenza ⁽⁹⁾ HA ⁽¹³⁾	Cervarix / Recombivax ou Engerix B / Neis-Vac-C ou Menjugate / dT adsorbées	
Femme enceinte	dcaT ⁽¹⁰⁾					HA ⁽¹³⁾	Adacel ou Boostrix	
50 ans ⁽⁶⁾	dT ⁽¹¹⁾		Pneu-C-20 ⁽¹²⁾			Influenza ⁽⁹⁾ HA ⁽¹³⁾	dT adsorbées / Prevnar20	

Notes:

- Administrer le BCG aux nourrissons de l'ensemble des villages du Nunavik, sur réception d'un résultat négatif au dépistage du DICS.
- La vaccination contre le rotavirus doit être entreprise avant l'âge de 20 semaines et complétée avant l'âge de 8 mois. Référer au médecin avant d'administrer le vaccin aux nourrissons immunosupprimés ou susceptibles de l'être, incluant ceux dont la mère a pris des agents biologiques en cours de grossesse (voir PIQ).
- Une dose additionnelle de DCaT est administrée à 6 mois pour certains enfants à risque, tels que les enfants immunodéprimés, prématurés (< 32 semaines) ou ayant un très faible poids à la naissance (<1500g), présentant une asplénie anatomique ou fonctionnelle ou ayant un implant cochléaire (Voir PIQ).
- Au Nunavik, le calendrier vaccinal comprend une dose additionnelle de Pneu-C 10 à l'âge de 6 mois.
- Administrer DCaT-VPI-Hib + Pneu-C-13 + RRO-Var le jour du 1er anniversaire ou le plus tôt possible après ce jour.
- Mettre à jour la vaccination lors des visites prévues en maternelle (4-6ans), en 7^{ième} année et lors du rappel de dT de 50 ans
- Pour les jeunes immunosupprimés, utiliser les calendriers à 3 doses à compléter en 4e année pour Gardasil et Twinrix Jr (Voir PIQ).
- Les vaccins prévus en 3^{ième} secondaire selon le PIQ sont plutôt donnés en 7^{ième} année au Nunavik.
- Le vaccin est recommandé annuellement durant la saison grippale à toute personne vivant dans les communautés éloignées ou isolées, dès l'âge de 6 mois. Chez l'enfant âgé de moins de 9 ans, 2 doses sont requises à 4 semaines d'intervalle la 1^{ère} fois qu'il est vacciné contre la grippe. La 2e dose est non requise si l'enfant a reçu au moins une dose de vaccin trivalent ou quadrivalent dans le passé.
- Vacciner les femmes enceintes contre la coqueluche à chaque grossesse, peu importe ses antécédents vaccinaux. Vacciner de préférence entre 26 et 32 semaines de gestation.

11. dT : aucune dose de rappel n'est nécessaire si une dose a été administrée depuis l'âge de 40 ans.

12. Administrer 1 dose de vaccin Pneu-C-20 aux personnes âgées de 50 ans et plus vivant au Nunavik. Pour les personnes qui ont reçu un vaccin Pneu-C-20, un vaccin Pneu-P n'est pas requis par la suite. Un intervalle minimal d'un an doit être respecté entre tout vaccin Pneu-C ou Pneu-P reçus dans le passé et l'administration du Pneu-C-20.

13. Au Nunavik, la vaccination contre l'hépatite A est recommandée pour toute personne non-adéquatement protégée à partir de 18 mois. Valider le statut vaccinal hépatite A de l'utilisateur et compléter la vaccination si nécessaire (1 dose du composant HA est requise pour les personnes vaccinées entre 1an et 19 ans OU 2 doses si la personne est vaccinée à ≥ 20 ans, à un intervalle recommandé de 6 à 12 mois).

Pour les clientèles immunodéprimées, aspléniques ou vivant avec des conditions médicales ou facteurs de risque particuliers (ex : maladies chroniques, diabète, itinérance, utilisation de drogues dures, etc) :

- Toujours vous référer au PIQ pour des recommandations vaccinales spécifiques : <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-calendriers-de-vaccination/autres-vaccins-recommandes/>
- Pour la vaccination contre le pneumocoque, les personnes immunodéprimées ou aspléniques, ainsi que les personnes de 18 à 49 ans vivant au Nunavik et ayant un facteur de risque particulier tel que mentionné au PIQ, consulter le PIQ pour recommandations spécifiques : <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/tableau-synthese-pour-l-utilisation-des-vaccins-contre-le-pneumocoque/#liste-des-autres-conditions>.