

CALENDRIER RÉGULIER D'IMMUNISATION DU NUNAVIK (MAJ 2024-06-13)

Âge	Vaccins						Noms commerciaux (À titre indicatif – sujet à changement)
1 mois	BCG ⁽¹⁾						BCG Japan
2 mois	DCaT	HB	VPI	Hib	Pneu-C-10 ⁽¹³⁾	Rota ⁽²⁾	Infanrix hexa / Synflorix ⁽¹³⁾ / RotaTeq ou Rotarix
4 mois	DCaT	HB	VPI	Hib	Pneu-C-10 ⁽¹³⁾	Rota ⁽²⁾	Infanrix hexa / Synflorix ⁽¹³⁾ / RotaTeq ou Rotarix
6 mois ⁽³⁾					Pneu-C-10 ⁽¹³⁾	Influenza ⁽⁷⁾	Synflorix ⁽¹³⁾
1 an ⁽⁴⁾	DCaT	VPI	Hib	RRO-Var	Pneu-C-13 ⁽¹³⁾	Influenza ⁽⁷⁾	Pediacef / Proquad ou Priorix-Tetra / Prevnar13 ⁽¹³⁾
18 mois	HAHB	Men-C-C	RRO-Var			Influenza ⁽⁷⁾	Twinrix Jr / Neisvac-C ou Menjugate / Proquad ou Priorix-Tetra
4 à 6 ans	dcaT	VPI	Var <i>Si n'a pas reçu 2 doses de Var antérieurement</i>	+ mise à jour du statut vaccinal		Influenza ⁽⁷⁾ HA ⁽¹¹⁾	Adacel-Polio ou Boostrix-Polio / +/- Varivax
4 ^e année (9-10 ans)	VPH-9	HA				Influenza ⁽⁷⁾	Gardasil 9 / Havrix (720 U) ou Vaqta (25 U)
7 ^e année ⁽⁵⁾	dT	HB	Men-C- ACWY ⁽⁶⁾	+ mise à jour du statut vaccinal		Influenza ⁽⁷⁾ HA ⁽¹¹⁾	dT adsorbées / Engerix B (0,5 mL) ou Recombivax HB (0,5 mL) / Nimenrix
Femme enceinte	dcaT ⁽⁸⁾					Influenza ⁽⁷⁾ HA ⁽¹¹⁾	Adacel ou Boostrix
50 ans ⁽¹⁴⁾	dT ⁽⁹⁾	Pneu-C-20 ⁽¹⁰⁾		+ mise à jour du statut vaccinal		Influenza ⁽⁷⁾ HA ⁽¹¹⁾	dT adsorbées / Prevnar20
75 ans ⁽¹⁴⁾	Zona-SU ⁽¹²⁾				Influenza ⁽⁷⁾		Shingrix

Notes:

1. Administrer le BCG aux nourrissons du Nunavik si résultat négatif au dépistage du DICS.
2. La vaccination contre le rotavirus doit être débutée avant l'âge de 20 semaines et complétée avant l'âge de 8 mois. Pour les enfants immunodéprimés ou susceptibles de l'être, les enfants avec antécédents d'invagination intestinale ou ceux présentant des symptômes de gastroentérites aiguës : référer au PIQ.
3. Une dose additionnelle de DCaT-VPI-Hib est administrée à 6 mois pour les enfants immunodéprimés, prématurés (< 32 semaines), de très faible poids de naissance (<1500g), présentant une asplénie anatomique ou fonctionnelle ou un implant cochléaire (Voir PIQ).
4. Administrer DCaT-VPI-Hib, Pneu-C-13, RRO-Var le jour du 1^{er} anniversaire ou le plus tôt possible après ce jour.
5. Les vaccins prévus en 3^{ème} secondaire dans le PIQ sont donnés en 7^{ème} année au Nunavik.
6. Omettre cette dose si 1 dose de Men-C-ACWY a été administrée à l'âge de 10 ans ou plus.
7. Le vaccin contre l'influenza est recommandé annuellement durant la saison grippale à toute personne vivant dans les communautés éloignées/ isolées, dès l'âge de 6 mois. Chez l'enfant âgé de moins de 9 ans, 2 doses sont requises à 4 semaines d'intervalle s'il s'agit de la 1^{ère} année où l'enfant reçoit le vaccin contre la grippe.
8. Vacciner les femmes enceintes contre la coqueluche à chaque grossesse, peu importe les antécédents vaccinaux. Vacciner de préférence entre 26 et 32 semaines de gestation.
9. Omettre cette dose si une dose de dT a été administrée depuis l'âge de 40 ans.
10. Administrer 1 dose de vaccin Pneu-C-20 aux personnes âgées de 50 ans et plus vivant au Nunavik. Un intervalle minimal d'un an doit être respecté entre tout vaccin Pneu-C ou Pneu-P et l'administration du Pneu-C-20.

11. Au Nunavik, la vaccination contre l'hépatite A est recommandée pour toute personne de 18 mois et plus non-adéquatement protégée. Compléter la vaccination si nécessaire (1 dose du composant HA est requise pour les personnes vaccinées entre 1 an et 19 ans OU 2 doses si la personne est vaccinée à ≥ 20 ans, à un intervalle recommandé de 6 à 12 mois).
12. Le calendrier recommandé pour la vaccination contre le zona comprend 2 doses, données à un intervalle recommandé de 2 à 12 mois.

13. Utiliser le vaccin Pneu-C-13 si le vaccin Pneu-C-10 n'est pas disponible. Si les vaccins Pneu-C-10 et Pneu-C-13 ne sont pas disponibles, utiliser le vaccin Pneu-C-15 ou Pneu-C-20 selon la disponibilité des produits.
14. Les frais de vaccination sont couverts par le programme SSNA pour les personnes âgées de 50 à 75 ans ET bénéficiaires de la CBJNQ, selon critères du programme.

ATTENTION! Ce calendrier n'inclut pas les recommandations spécifiques s'adressant à une clientèle immunodéprimée, asplénique, vivant avec des conditions médicales ou facteur(s) de risque particulier(s) (ex : maladies chroniques, itinérance, utilisation de drogues dures, harsah, etc.). Vous devez vous référer au PIQ pour des recommandations vaccinales adaptées à cette clientèle et suivre les calendriers spécifiques lorsque applicable.

Liens utiles :

15. <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-calendriers-de-vaccination/autres-vaccins-recommandes/>
16. Vaccins contre le pneumocoque : <https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/tableau-synthese-pour-l-utilisation-des-vaccins-contre-le-pneumocoque/>