

Immunisation des bébés contre le virus respiratoire syncytial (VRS)

ბავშვის ოფიციალური ინფორმაცია ვაქცინაციის შესახებ (RSV-IC)

Comment protéger votre bébé?

Une seule dose de traitement préventif est recommandée pour protéger votre bébé contre les formes graves et les complications de l'infection au VRS. Ce traitement consiste à administrer des anticorps à votre bébé afin de le protéger durant ses premiers mois de vie. Le traitement préventif est sécuritaire et, dans la majorité des cas, il ne provoque aucune réaction.

როგორ დავიცავთ ბავშვს?

ბავშვს ერთჯერადი დოზა ვაქცინაციის საფორმის სახით ან ინექციის სახით RSV ვაქცინაცია. ბავშვს ვაქცინაცია მიეცემა ორჯერ: პირველი დოზა და მეორე დოზა. ბავშვს ვაქცინაცია მიეცემა ადგილობრივი ან ცენტრალური საავადმყოფოში.

Qui devrait recevoir le traitement préventif?

- Les bébés nés pendant la saison du VRS.
- Les bébés de moins de 8 mois au début de la saison du VRS qui n'ont pas encore reçu le traitement.
- Les bébés de moins de 19 mois présentant une condition qui augmente leur risque de développer une infection grave au VRS.

როგორ ვაქცინირდება ბავშვი?

- ადრე დროისთვის ვაქცინაციის მიღება (პირველი დოზა).
- ადრე 8-თვიანი ვაქცინაციის მიღება ვაქცინაციის მიღების შემდეგ.
- მეორე ვაქცინაციის მიღება 19-თვიანი ვაქცინაციის მიღების შემდეგ ან RSV-IC ვაქცინაციის მიღების შემდეგ.

Le traitement préventif est-il sécuritaire?

Le traitement préventif est sécuritaire. Dans la majorité des cas, il ne provoque aucune réaction. Vérifiez avec votre CLSC, un professionnel de la santé ou votre sage-femme lors de votre prochaine visite.

ინფორმაციის გაცემის გზები?

ინფორმაციის გაცემის გზები. ადგილობრივი, რეგიონალური ან ფედერალური საავადმყოფო, ან საავადმყოფოს დირექტორის ან საავადმყოფოს დირექტორის ან საავადმყოფოს დირექტორის.

Quand et où votre bébé peut-il recevoir ce traitement préventif?

Le traitement préventif contre le VRS est offert durant la saison du VRS, habituellement à l'automne et en hiver. Il est proposé à tous les nouveau-nés avant leur départ de l'hôpital ou de la maison de naissance. Si votre bébé ne l'a pas reçu à la naissance, il peut l'obtenir dans un point de service local ou dans un CLSC (centre local de services communautaires).

როგორ ვაქცინირდება ბავშვი?

RSV-IC-ის მიღება ბავშვს ადრე დროისთვის ან 8-თვიანი ვაქცინაციის მიღების შემდეგ. ადრე დროისთვის ან 8-თვიანი ვაქცინაციის მიღების შემდეგ. ადრე დროისთვის ან 8-თვიანი ვაქცინაციის მიღების შემდეგ.

Comment prévenir la transmission?

- Lavez-vous souvent les mains.
- Toussez ou éternuez dans votre coude.
- Restez à la maison si vous présentez des symptômes.

როგორ ვაქცინირდება ბავშვი?

- ადრე დროისთვის ან 8-თვიანი ვაქცინაციის მიღების შემდეგ.
- ადრე დროისთვის ან 8-თვიანი ვაქცინაციის მიღების შემდეგ.
- ადრე დროისთვის ან 8-თვიანი ვაქცინაციის მიღების შემდეგ.



რეგიონალური ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების საბჭო
RÉGIONALE DE LA NUNAVIK REGIONAL
SANTÉ ET DES SERVICES BOARD OF HEALTH
SOCIAUX DU NUNAVIK AND SOCIAL SERVICES