

CAMPAGNE SAISONNIÈRE D'IMMUNISATION CONTRE LES VIRUS RESPIRATOIRES 2026-2027

	Choix de produits immunisants		
Clientèles :	Influenza ¹	COVID-19	VRS et Ac-VRS
Enfants (0 à 17 ans)	À partir de 6 mois: Fluzone /Fluviral 0,5ml IM	N/A	Nirsévimab - Nouveau-nés nés en cours de saison VRS (30 septembre 2026 ou après) et nourrissons de moins de 8 mois (nés depuis le 1^{er} février 2026) n'ayant jamais reçu de dose d'Ac-VRS : 0,5ml (moins de 5kg) ou 1,0ml IM (5kg ou plus) - Nourrissons âgés de moins de 19 mois (nés à partir du 1^{er} mars 2025) et présentant l'une des conditions de vulnérabilité au VRS²: 2 injections de 1,0 ml IM
Adultes (18 ans et +)	- Fluzone /Fluviral 0,5ml IM ou 75 ans et plus: Fluad 0,5ml IM si disponible	- Spikevax 0,5ml IM ou - Comirnaty 0,3ml IM	75 ans et plus vivant en communauté: mRESVIA 0,5ml IM
Femmes enceintes			
Travailleurs de la santé (TdeS)			
Personnes de ≥ 6 mois atteintes de maladie(s) chronique(s)³, dialysées et/ou immunodéprimées	- Fluzone /Fluviral 0,5ml IM ou 75 ans et plus avec maladies chroniques : Fluad 0,5ml IM si disponible	Spikevax 6mois-11 ans : 0,25ml IM (<i>vial multidoses uniquement</i>) 12 ans et plus : 0,5ml IM ou Comirnaty 12 ans et plus : 0,3ml IM	Voir l'encadré sur le nirsévimab pour les indications d'immunisation contre le VRS chez les nourrissons de moins de 19 mois. Personnes de 18 ans et plus ayant subi une greffe de cellules souches hématopoïétiques (GSCH) dans les deux années précédentes ou une greffe pulmonaire : Arexvy 0,5ml IM
CHSLD (Kuujuuaq et Puvirnituaq)	- Fluzone /Fluviral 0,5ml IM ou 65 ans et plus : Fluad 0,5ml IM	- Spikevax 0,5ml IM ou - Comirnaty 0,3ml IM	60 ans et plus: Arexvy 0,5ml IM (si n'a jamais reçu de vaccin contre le VRS)
RPA	- Fluzone /Fluviral 0,5ml IM ou 75 ans et plus: Fluad 0,5ml IM si disponible	- Spikevax 0,5ml IM ou - Comirnaty 0,3ml IM	75 ans et plus: Arexvy 0,5ml IM (si n'a jamais reçu de vaccin contre le VRS)

¹ La vaccination contre l'influenza doit être offerte aux personnes vivant sous le même toit que les personnes appartenant à un groupe à risque ainsi qu'à leurs proches aidants, y compris à l'entourage des enfants de moins de 6 mois.

² Consultez la page [Ac-VRS : anticorps monoclonal contre le virus respiratoire syncytial \(VRS\) - Immunoglobulines et anticorps monoclonaux - Professionnels de la santé - MSSS](#) pour plus de détails sur les conditions de vulnérabilité admissibles.

³ Consultez le tableau [Fiche indicative concernant la vaccination contre la grippe, contre la COVID-19 et contre le virus respiratoire syncytial \(VRS\)](#) ou le PIQ pour plus de détails sur les maladies chroniques admissibles.