



RÉACTIONS POSSIBLES AU VACCIN



Douleur, rougeur,
petite plaie au site
d'injection.



Gonflement des
ganglions dans
l'aisselle ou
au-dessus de la
clavicule du côté
du site d'injection.



Petite bosse rouge
contenant du
liquide qui peut
apparaître de 2 à 4
semaines après le
vaccin. Celle-ci
peut prendre de 2
à 5 mois avant de
disparaître et
laisser une petite
cicatrice.



Fièvre, rougeurs
sur la peau et
yeux rouges.

*Dans de très rares cas,
une réaction allergique ou
une infection généralisée
peuvent survenir.*



*Ces réactions demeurent
extrêmement rares et le
bénéfice de la vaccination
surpasse grandement
les risques.*

SOINS À APPORTER APRÈS LE VACCIN



Appliquer une
compresse d'eau
froide au site
d'injection



Laver le bras
du bébé
normalement



Si présence
de plaie,
couvrir avec
une gaze
jusqu'à la
formation
d'une croûte



Utiliser un
médicament
contre la fièvre
pour bébé au
besoin



NE PAS
crever la
petite cloque
si elle se
développe



NE PAS
masser

NE PAS
appliquer
d'onguent
ou crème



NE PAS
appliquer un
pansement
adhésif
sur la plaie
(ex : band aid)



BCG

Tout ce qu'il faut savoir



**Information à
l'intention des
parents sur le
vaccin (BCG)
contre la
tuberculose**

LE BCG EST UN VACCIN ...

Qui protège les enfants de la tuberculose et surtout de formes graves de la maladie.



Offert à tous les nourrissons d'un mois au Nunavik depuis janvier 2023.

QU'EST-CE QUE LA TUBERCULOSE ?



Une maladie contagieuse causée par une bactérie.

Elle affecte le plus souvent les poumons, mais aussi d'autres parties du corps (os, cerveau, reins, etc).



... TUBERCULOSE



Elle peut entraîner des complications graves et même être mortelle.



Les enfants de moins de 2 ans sont particulièrement à risque.

LE VACCIN BCG

Le BCG est sécuritaire

Il provoque parfois des réactions légères qui disparaissent d'elles-mêmes.

L'efficacité du BCG
à 75%
à 80%

Le BCG n'est pas recommandé pour certains enfants ayant des problèmes graves du système immunitaire.

Avant de recevoir le BCG, une évaluation est faite pour s'assurer que votre enfant est éligible :



Un test de dépistage du déficit immunitaire combiné sévère (DICS) est offert à la naissance



Un test cutané à la tuberculine (TCT) peut également être recommandé

Pour toute question ou si des symptômes vous inquiètent, contactez votre CLSC.

Mise à jour Décembre 2022
Tiré de « Vaccin contre la Tuberculose », MSSS, Mai 2013.
Tiré de « Bacille Calmette-Guerin – Fact Sheet, Nunavut, Octobre 2012. Janvier 2017