

INFECTION TUBERCULOSE LATENTE
ADULTE ET PÉDIATRIQUE
PROTOCOLE DE SUIVI – ORDONNANCE
MÉDICALE STANDARD • RIFAMPICINE (RIF)

EMBOSSER ICI LA CARTE DU CSI OU CSTU,
SI NON DISPONIBLE, INSCRIRE LES NOM, PRÉNOM,
DATE DE NAISSANCE ET NUMÉRO DOSSIER
EMBOSS HERE THE CARD OF IHC OR UTHC,
IF NOT AVAILABLE, WRITE THE NAME, SURNAME,
DATE OF BIRTH AND FILE NUMBER

But : Uniformiser la prise en charge des cas d'infection tuberculeuse latente (ITL) et assurer la prescription médicale du suivi nécessaire par les différents professionnels de la santé concernés.

Objectifs :

- S'assurer d'une prophylaxie optimale contre l'ITL afin de prévenir l'apparition d'une tuberculose active.
- Offrir un suivi optimal et régulier aux personnes avec une ITL en cours de traitement.
- Identifier rapidement les problèmes d'**observance** et offrir le soutien approprié.
- Détecter précocement les événements indésirables et assurer leur prise en charge (Guide TB, Québec, 2017)

Cette ordonnance doit être initiée par un médecin au moment du diagnostic d'ITL et de la prescription d'anti-tuberculeux.

Notes:

- Pour rejoindre les médecins répondants en pneumologie :
 - Pneumologue pédiatrique : mchtb@muhc.mcgill.ca
 - Pneumologue pour adulte : [Conseil numérique](mailto:Conseil_numerique@ssss.gouv.qc.ca) ou Faiz Ahmad Khan faiz_ahmad.khan.med@ssss.gouv.qc.ca ou Richard Menzies, Dr. dick.menzies@mcgill.ca
 - Pneumologue de garde au CUSM : **514 934-1934**.

- Lorsqu'une personne est nouvellement diagnostiquée ITL, aviser Tuberculose Sante Publique (RRSSSN) tuberculose-santepublique.nrbhss@ssss.gouv.qc.ca.

Note importante: Toute prescription médicale individuelle a préséance sur le suivi « Standard » décrit dans cette procédure.

Instruction d'utilisation du protocole

L'ordonnance suivante, une fois signée et datée par le médecin, sert de prescription médicale pour les bilans et les examens paracliniques nécessaires au suivi des patients atteints d'ITL. L'infirmière et le médecin doivent signer et cocher les cases qui se rapportent à leurs tâches au fur et à mesure que les actions auront été prises.

Les prescriptions de médicaments se feront cependant sur les feuilles de prescription spécifiques au traitement d'ITL.

- Rédigé par : Dre Latoya Campbell du CSTU & Dre Élise Bélanger-Desjardins du CSI
Dr Jean-François Proulx et l'équipe Inf. en maladies infectieuses de la RRSSSN
Dr Faiz Ahmad Khan & Dr David Zielinski, pneumologues & consultants TB, CUSM et Nunavik
- Révisé par : Dre Latoya Campbell du CSTU & Dre Élise Bélanger-Desjardins du CSI
Dr Jean-François Proulx et Aurélie Heurtebize de la RRSSSN le 2020-10-01
- Approuvé par : Comité exécutif du CMDPSF du CSI et du CSTU le 2020-12.



Centre de Santé et Services Sociaux Inuulitsivik
 Inuulitsivik Health & Social Services Centre
 Puvirnituq, Québec J0M 1P0
 T 819 988-2957 / F 819 988-2796
 ᐅᐃᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ
 UNGAVA TULATTAVIK HEALTH CENTER
 CENTRE DE SANTÉ TULATTAVIK DE L'UNGAVA

EMBOSSER ICI LA CARTE DU CSI OU CSTU,
 SI NON DISPONIBLE, INSCRIRE LES NOM, PRÉNOM,
 DATE DE NAISSANCE ET NUMÉRO DOSSIER
 EMBOSS HERE THE CARD OF IHC OR UTHC,
 IF NOT AVAILABLE, WRITE THE NAME, SURNAME,
 DATE OF BIRTH AND FILE NUMBER

INFECTION TUBERCULOSE LATENTE
ADULTE ET PÉDIATRIQUE
PROTOCOLE DE SUIVI – ORDONNANCE
MÉDICALE STANDARD • RIFAMPICINE (RIF)

Résultat de Quantiféron positif le : aaaa / mm / jj (si applicable)

Résultat du TCT: mm Date : / aaaa / mm ii

Valeurs seuils du résultat du TCT et indications de traitement de l'ITL

TCT	Indications de traitement préventif
≥ 5 mm	<input type="checkbox"/> Personne résidant dans un village prioritaire¹ <input type="checkbox"/> Dépistage de masse dans un contexte d'éclosion ET selon la DSPu du Nunavik <input type="checkbox"/> Enfant vacciné au BCG depuis < 24 mois
≥ 5 mm	<input type="checkbox"/> Infection à VIH <input type="checkbox"/> Contact récent avec un cas de tuberculose contagieuse <input type="checkbox"/> Maladie fibronodulaire visible à la radiographie pulmonaire (tuberculose guérie, mais non traitée antérieurement ou traitée inadéquatement) <input type="checkbox"/> Greffe d'organe (associée à un traitement immunosuppresseur) <input type="checkbox"/> Autres médicaments immunosuppresseurs, p. ex. corticoïdes (l'équivalent de ≥ 15 mg/jour de prednisone pendant 1 mois ou plus; le risque de tuberculose active augmente avec la dose et la durée du traitement) <input type="checkbox"/> Insuffisance rénale nécessitant une hémodialyse <input type="checkbox"/> Prise d'inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale alpha [TNFα],
≥ 10 mm	<input type="checkbox"/> Personne résidant dans un village non prioritaire selon la DSPu du Nunavik <input type="checkbox"/> Virage dans les 2 dernières années sans exposition connue <input type="checkbox"/> Virage à la suite d'un contact récent, peu importe le délai écoulé entre les 2 TCT <input type="checkbox"/> Autre déficit immunitaire (cancer de la tête et du cou) <input type="checkbox"/> Silicose <input type="checkbox"/> Les personnes de tous âges ayant voyagé au cours des 2 dernières années dans un pays à incidence élevée en tenant compte de la durée de séjour et du type d'activités réalisées <input type="checkbox"/> Les utilisateurs de drogues par injection, séronégatifs pour le VIH • Les travailleurs ou les résidents d'un établissement de santé ou d'un établissement correctionnel • Les travailleurs de refuges pour sans-abri • Les sans-abri qui peuvent être traités dans le cadre d'un traitement préventif sous observation directe <input type="checkbox"/> Tout autre patient considéré comme à risque accru (diabète sucré, insuffisance pondérale, fumeur d'un paquet ou plus par jour)

Signature du MD : _____ N° permis : _____ Date : aaaa / mm / jj

¹ Pour connaître la liste des villages prioritaires établie par la Direction de santé publique, se référer à [Boîte à outils – Tuberculose](#).



Centre de Santé et Services Sociaux Inuulitsivik
Inuulitsivik Health & Social Services Centre
Puvirnituq, Québec J0M 1P0
T 819 988-2957 / F 819 988-2796

ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ
UNGAVA TULATTAVIK HEALTH CENTER
CENTRE DE SANTÉ TULATTAVIK DE L'UNGAVA

EMBOSSER ICI LA CARTE DU CSI OU CSTU,
SI NON DISPONIBLE, INSCRIRE LES NOM, PRÉNOM,
DATE DE NAISSANCE ET NUMÉRO DOSSIER
EMBOSS HERE THE CARD OF IHC OR UTHC,
IF NOT AVAILABLE, WRITE THE NAME, SURNAME,
DATE OF BIRTH AND FILE NUMBER

INFECTION TUBERCULOSE LATENTE
ADULTE ET PÉDIATRIQUE
PROTOCOLE DE SUIVI – ORDONNANCE
MÉDICALE STANDARD • RIFAMPICINE (RIF)

Temps	Suivi	Interventions et Investigations	Date et Signature
Pré-traitement	MD	<p>Avant de prescrire RIF :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> S'assurer que RXP récente (< 12 semaines depuis le RXP précédent) <input type="checkbox"/> Si BK demandés, s'assurer du résultat négatif des cultures (sauf avis contraire du spécialiste consulté) <p>Vérifier également si:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TB active antérieure: <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non 2. Antécédents d'hépatite secondaire à antituberculeux : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non 3. Cas index résistant à RIF²: <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <p>Note: Si Oui à 1, 2 ou 3: consulter médecins répondants en pneumologie³ Si Non à 1, 2 et 3, débiter le traitement ITL: (ITL-PRESC-MED-RIF)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Prescrire Bilan hépatique, Créat., FSC (adulte et enfant), Syphilis⁴ <input type="checkbox"/> Vérifier avec pharmacien si interactions médicamenteuses (par ex.: Dilantin) <input type="checkbox"/> Prévoir dosage de médication (ex.: dilantinémie) en cours de traitement si requis <input type="checkbox"/> Counseling contraception si contraceptifs oraux. Privilégier progéstatifs, stérilet ou condom. 	<p>Signature</p> <p>AA/ MM/ JJ</p>
1 ^{er} jour / date du début du Tx AA/ MM/ JJ	Inf.	<p>Avant de débiter RIF :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> S'assurer de l'absence de symptômes suggestifs de tuberculose active. Si présence de symptômes, demander avis médical STAT avant de débiter le traitement. <input type="checkbox"/> Débiter Rifampicine (RIF) selon prescription médicale <input type="checkbox"/> Enseignement à la clientèle (traitement, observance, effets secondaires) <input type="checkbox"/> Prévoir formulaires de suivi: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Courbe d'observance (ITL-COURBE-RIF) <input type="checkbox"/> Enregistrement de la médication (ITL-ENREG-MED-RIF) <input type="checkbox"/> Évaluation clinique mensuelle (TB-ACT-ITL_EVAL-CLIN-MENS) <input type="checkbox"/> Faire bilan hépatique, Créat., FSC (adulte et enfant), Syphilis⁴ tel que prescrit plus haut. 	<p>Signature</p> <p>AA/ MM/ JJ</p>

Signature du MD : _____ N° permis : _____ Date : ____/____/____

² Si l'antibiogramme chez le cas index n'est pas connu au moment de prescrire le traitement préventif, assurez-vous d'ajuster le régime de l'usager dès qu'une résistance au traitement antituberculeux prescrit est confirmée.

³ Les coordonnées pour rejoindre les médecins répondants en pneumologie sont indiquées en page 1 de ce document.

⁴ Offrir dépistage de la syphilis chez les ≥ 14 ans dû à l'épidémiologie de la région. Référez les résultats pour suivi équipe ITSS.



Centre de Santé et Services Sociaux Inuulitsivik
 Inuulitsivik Health & Social Services Centre
 Puvirnituq, Québec J0M 1P0
 T 819 988-2957 / F 819 988-2796
 ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ
 UNGAVA TULATTAVIK HEALTH CENTER
 CENTRE DE SANTÉ TULATTAVIK DE L'UNGAVA

EMBOSSER ICI LA CARTE DU CSI OU CSTU,
 SI NON DISPONIBLE, INSCRIRE LES NOM, PRÉNOM,
 DATE DE NAISSANCE ET NUMÉRO DOSSIER
 EMBOSS HERE THE CARD OF IHC OR UTHC,
 IF NOT AVAILABLE, WRITE THE NAME, SURNAME,
 DATE OF BIRTH AND FILE NUMBER

INFECTION TUBERCULOSE LATENTE
ADULTE ET PÉDIATRIQUE
PROTOCOLE DE SUIVI – ORDONNANCE
MÉDICALE STANDARD • RIFAMPICINE (RIF)

Temps*	Suivi	Interventions et Investigations	Date et Signature
Fin du 1 ^{er} mois de Tx AA/ MM/ JJ	Inf.	<input type="checkbox"/> Suivi mensuel régulier: Si anormal, aviser le médecin <input type="checkbox"/> Suivi de la médication et soutien au client: (ITL-COURBE-RIF) et (ITL-ENREG-MED-RIF) <input type="checkbox"/> Évaluation clinique mensuelle (TB-ACT-ITL_EVAL-CLIN-MENS) <input type="checkbox"/> Sur prescription médicale, faire bilan hépatique, Créat. PRN (adulte ⁵ et enfant ⁶)	Signature AA/ MM/ JJ
Fin du 2 ^e mois de Tx AA/ MM/ JJ	Inf.	<input type="checkbox"/> Suivi mensuel régulier: Si anormal, aviser le médecin <input type="checkbox"/> Suivi de la médication / soutien au client: (ITL-COURBE-RIF) et (ITL-ENREG-MED-RIF) <input type="checkbox"/> Évaluation clinique mensuelle (TB-ACT-ITL_EVAL-CLIN-MENS) <input type="checkbox"/> Sur prescription médicale, faire bilan hépatique, Créat. PRN (adulte ⁵ et enfant ⁶)	Signature AA/ MM/ JJ
Fin du 3 ^e mois de Tx AA/ MM/ JJ	Inf.	<input type="checkbox"/> Suivi mensuel régulier: Si anormal, aviser le médecin <input type="checkbox"/> Suivi de la médication / soutien au client: (ITL-COURBE-RIF) et (ITL-ENREG-MED-RIF) <input type="checkbox"/> Évaluation clinique mensuelle (TB-ACT-ITL_EVAL-CLIN-MENS) <input type="checkbox"/> Sur prescription médicale, faire bilan hépatique, Créat. PRN (adulte ⁵ et enfant ⁶)	Signature AA/ MM/ JJ
Fin de Tx (4 ^e mois) AA/ MM/ JJ	Inf.	<input type="checkbox"/> Suivi mensuel régulier: Si anormal, aviser le médecin <input type="checkbox"/> Suivi de la médication / soutien au client: (ITL-COURBE-RIF) et (ITL-ENREG-MED-RIF) <input type="checkbox"/> Évaluation clinique mensuelle (TB-ACT-ITL_EVAL-CLIN-MENS) <input type="checkbox"/> Sur prescription médicale, faire bilan hépatique, Créat. PRN (adulte ⁵ et enfant ⁶) <input type="checkbox"/> Au besoin, planifier suivi clinico-radiologique selon avis médical inscrit au formulaire <i>Guide de suivi clinico-radiologique</i> (TB-ACT-ITL_GUIDE-SCR) <input type="checkbox"/> Acheminer tous ces documents complétés à la DSPu	Signature AA/ MM/ JJ

*NOTE: Appliquer les interventions de *Fin de traitement* si le traitement prend fin avant le 4^e mois
 Signature du MD : _____ N° permis : _____ Date : ____/____/____

⁵ Si symptomatique **OU** ≥ 50 ans **OU** si présence d'une des conditions suivantes : grossesse ou accouchement au cours des 3 derniers mois, cirrhose évolutive ou hépatite évolutive chronique toutes causes confondues, hépatite C, hépatite B avec des concentrations de transaminases anormales, consommation quotidienne d'alcool, prise d'autres médicaments hépatotoxiques, antécédents d'hépatite provoquée par des médicaments. (Guide d'intervention – La tuberculose, MSSS, 2017)
⁶ Si symptomatique ou bilan de base anormal.



Centre de Santé et Services Sociaux Inuulitsivik
 Inuulitsivik Health & Social Services Centre
 Puvirnituq, Québec J0M 1P0
 T 819 988-2957 / F 819 988-2796
 ᐅᖃᕐᕐ ᐅᕐᕐᕐᕐ ᐅᕐᕐᕐᕐᕐᕐ
 UNGAVA TULATTAVIK HEALTH CENTER
 CENTRE DE SANTÉ TULATTAVIK DE L'UNGAVA

EMBOSSER ICI LA CARTE DU CSI OU CSTU,
 SI NON DISPONIBLE, INSCRIRE LES NOM, PRÉNOM,
 DATE DE NAISSANCE ET NUMÉRO DOSSIER
 EMBOSS HERE THE CARD OF IHC OR UTHC,
 IF NOT AVAILABLE, WRITE THE NAME, SURNAME,
 DATE OF BIRTH AND FILE NUMBER

**INFECTION TUBERCULOSE LATENTE
 ADULTE ET PÉDIATRIQUE
 PROTOCOLE DE SUIVI – ORDONNANCE
 MÉDICALE STANDARD • RIFAMPICINE (RIF)**

GUIDE DE SUIVI POUR MOIS SUPPLÉMENTAIRES			
Délai dans la durée prévue du traitement			
À utiliser si le traitement se prolonge au-delà de 4 mois. Appliquer les interventions de la ligne <i>Fin de traitement</i> si un seul mois supplémentaire est nécessaire pour compléter le traitement. Au-delà de 6 mois, la prophylaxie est considérée inadéquate.			
Temps	Suivi	Interventions et Investigations	Date et Signature
Fin du 5 ^e mois de Tx AA/ MM/ JJ	Inf.	<input type="checkbox"/> Suivi mensuel régulier: Si anormal, aviser le médecin <input type="checkbox"/> Suivi de la médication / soutien au client : (ITL-COURBE-RIF) et (ITL-ENREG-MÉD-RIF) <input type="checkbox"/> Évaluation clinique mensuelle (TB-ACT-ITL_EVAL-CLIN-MENS) <input type="checkbox"/> Sur prescription médicale, faire bilan hépatique, Créat. PRN (adulte ⁵ et enfant ⁶)	Signature AA/ MM/ JJ
Fin de Tx (5 ^e ou 6 ^e mois) AA/ MM/ JJ	Inf.	<input type="checkbox"/> Suivi mensuel régulier: Si anormal, aviser le médecin <input type="checkbox"/> Suivi de la médication / soutien au client : (ITL-COURBE-RIF) et (ITL-ENREG-MÉD-RIF) <input type="checkbox"/> Évaluation clinique mensuelle (TB-ACT-ITL_EVAL-CLIN-MENS) <input type="checkbox"/> Sur prescription médicale, faire bilan hépatique, Créat. PRN (adulte ⁵ et enfant ⁶) <input type="checkbox"/> Au besoin, planifier suivi clinico-radiologique selon avis médical inscrit au formulaire <i>Guide de suivi clinico-radiologique</i> (TB-ACT-ITL_GUIDE-SCR) <input type="checkbox"/> Acheminer tous ces documents complétés à la DSPu	Signature AA/ MM/ JJ
	MD	<input type="checkbox"/> Documenter l'observance et la fin de traitement <input type="checkbox"/> Compléter et signer le <i>Guide de suivi clinico-radiologique en post fin de traitement</i> (TB-ACT-ITL_GUIDE-SCR) <input type="checkbox"/> Mettre à jour la liste des problèmes (antécédents) au dossier patient	Signature AA/ MM/ JJ

Signature du MD: _____ N° permis: _____ Date: ____/ ____/ ____