



Centre de Santé et Services Sociaux Inuulitsivik
Inuulitsivik Health & Social Services Centre
 Puvirnituk, Québec J0M 1P0
 T 819 988-2957 / F 819 988-2796
 ᐅᓕᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ
UNGAVA TULATTAVIK HEALTH CENTER
CENTRE DE SANTÉ TULATTAVIK DE L'UNGAVA

EMBOSSER ICI LA CARTE DU CSI OU CSTU,
 SI NON DISPONIBLE, INSCRIRE LES NOM, PRÉNOM,
 DATE DE NAISSANCE ET NUMÉRO DOSSIER
 EMBoss HERE THE CARD OF IHC OR UTHC,
 IF NOT AVAILABLE, WRITE THE NAME, SURNAME,
 DATE OF BIRTH AND FILE NUMBER

Programme de Tuberculose
Prescription médicale

TRAITEMENT TUBERCULOSE ACTIVE
Phase initiale - ENFANT

Allergies : Nil ou Préciser : _____

Grossesse : _____ semaines Allaitement



ENFANT (moins de 15 ans)

Date de prescription : ____/____/____
 AAAA-MM-JJ

Poids : ____ kg

PHASE INITIALE¹ (PHASE 1)

- Isoniazide (INH) 10-15 mg/kg (max. : 300 mg), soit :
- Rifampicine (RIF) 10-20 mg/kg (max. : 600 mg)², soit :
- Pyrazinamide (PZA) 30-40 mg/kg (max. : 2 g), soit :
- Ethambutol³ (EMB) 15-25 mg/kg (max. : 2,5 g), soit :
- Pyridoxine (vit. B6) 1 mg/kg (max. : 25 mg), soit :
- _____, soit :

À COMPLÉTER PAR LA PHARMACIE :

_____ mg PO die x 60 doses
 _____ mg PO die x 60 doses
 _____ mg PO die x 60 doses
 _____ mg PO die x 60 doses
 _____ mg PO die x 60 doses
 _____ mg PO die x 60 doses

Signature du médecin : _____ Lettres moulées : _____ Licence # : _____

¹ Traitement en thérapie d'observation directe (TOD) 5x/semaine (lun-ven) et auto-administré (AA) 2x/semaine (sam-dim). Les doses omises devront être reprises avant le début de la phase de continuation (phase 2).
² Si > 60 kg, Rifampicine (RIF) 10 mg/kg (10-12 mg/kg) (max. : 900 mg) peut être utilisé avec une surveillance étroite des effets secondaires hépatotoxiques.
³ Omettre EMB si enfant ≤ 10 ans ET si cas source est connu et sans résistance, ou sans suspicion de résistance aux anti-tuberculeux de base.

J'atteste que cette prescription, transmise par télécopieur ou courriel, sera considérée comme étant valide et l'unique originale. La pharmacie mentionnée plus bas en est la seule destinataire. La prescription ne sera pas réutilisée ou dupliquée.

Cocher le nom du village d'origine et la pharmacie concernée :

Centre de santé Inuulitsivik		Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	
<input type="checkbox"/> Salluit 819 255-9090	<input type="checkbox"/> Inukjuak 819 254-9090	<input type="checkbox"/> Kangiqsualujuaq 819 337-9090	<input type="checkbox"/> Kangirsuk 819 935-9090
<input type="checkbox"/> Ivujivik 819 922-9090	<input type="checkbox"/> Umiujaq 819 331-9090	<input type="checkbox"/> Kuujuaq 819 964-2905	<input type="checkbox"/> Quaqtaq 819 492-9090
<input type="checkbox"/> Akulivik 819 496-9090	<input type="checkbox"/> Kuujuarapik 819 929-9090	<input type="checkbox"/> Aupaluk 819 491-9090	<input type="checkbox"/> Kangiqsujaq 819 338-9090
<input type="checkbox"/> Puvirnituk 819 988-9090			<input type="checkbox"/> Tasiujaq 819 633-9090
<input type="checkbox"/> PHARMACIE INUULITSIVIK, PUVIRNITUQ Tél. : 819 988-2957 #263 /292 Fax : 819 988-2551 Courriel : pharmacie.pov@ssss.gouv.qc.ca		<input type="checkbox"/> PHARMACIE TULATTAVIK, KUUJUAQ Tél. : 819 964-2905 # 201/277 Fax : 819 964-0035 Courriel : kuujuaq.pharmacy@ssss.gouv.qc.ca	
<input type="checkbox"/> PHARMACIE VOYER, MONTRÉAL Tél. : 1 877 426-0406 Télécopieur : 1 877 426-0546 Courriel : fphx022@pharmaprix.ca			