

# Vaccination contre la COVID-19 au Nunavik (MAJ 2022-10/18)

*En tout temps, les directives contenues dans le PIQ prévalent sur ce document et doivent être appliquées.*

## OFFRE VACCINALE DE BASE AU NUNAVIK

- Offre de vaccination **minimalement une fois/semaine** (jeudis), avec ou sans rendez-vous dans chaque CLSC, en plus d'une offre complémentaire périodique hors CLSC.

## SAISIE AU REGISTRE VACCINAL, GESTION DES PERTES ET RAPPORT DE VACCINATION

- La saisie au registre vaccinal doit être complétée avant 22h le jour de l'administration.
- L'inventaire physique des fioles de vaccins COVID-19 doit être effectué **minimalement 1x / semaine**.
- Toute perte de fioles **non-entamées** doivent être déclarée (Ex : délai de conservation au réfrigérateur dépassé, fiole expirée, BCF, etc.).

## MANIFESTATIONS CLINIQUES INHABITUELLES (MCI)

Les formulaires AH-728 remplis doivent être envoyés à [vanessa.drolet.ciusscn@ssss.gouv.qc.ca](mailto:vanessa.drolet.ciusscn@ssss.gouv.qc.ca)

## Calendrier de vaccination :

- La **primovaccination** des personnes immunocompétentes est de **2 doses** (intervalle recommandé de 8 semaines et plus).
- Une **dose de rappel** est recommandée pour les groupes suivants (intervalle recommandé de 5 mois, intervalle minimal de 3 mois) :
  - Les personnes âgées de 18 ans et plus;
  - Les personnes âgées de 5 ans à 17 ans considérées comme à risque élevé de complications et celles de 12-17 ans vivant dans un milieu collectif fermé\*.  
\*Cette dose peut aussi être offerte aux personnes âgées de 5 à 17 ans en bonne santé qui souhaitent la recevoir.

Une **dose additionnelle** est recommandée aux personnes suivantes (intervalle recommandé de 5 mois, intervalle minimal de 3 mois) et ce, peu importe le nombre de doses de rappel reçues antérieurement :

- Personnes de 18 ans et plus;
- Personnes de 12 ans et plus immunodéprimées ou dialysées, ou celles à risque élevé de complications;
- Travailleurs de la santé
- Femmes enceintes

Il est recommandé de respecter un intervalle de 3 mois depuis un **épisode de COVID-19** avant de recevoir une dose de vaccin.

Pour les personnes **immunodéprimées** et/ou **dialysées**, veuillez consulter les recommandations spécifiques dans le PIQ.

## Groupes d'âge

# Choix préférentiels de vaccin contre la COVID-19 selon l'âge :

- Les vaccins présentés sont les choix à privilégier pour chaque groupe d'âge, selon le Comité en immunisation du Québec (CIQ).
- D'autres vaccins sont autorisés selon l'âge. Consultez le PIQ pour connaître les autres options de vaccins autorisés au besoin.

6 mois à 4 ans

### Moderna Spikevax PÉDIATRIQUE (0,10 mg/ml)

capuchon bleu roi  
Fiole multidoses de 2,5 ml



5 à 11 ans

### Pfizer Comirnaty PÉDIATRIQUE

capuchon orange  
Fiole multidoses de 2,5 ml



12 ans à 29 ans

#### Primovaccination :

### Pfizer Comirnaty RÉGULIER

capuchon mauve,  
Fiole multidoses non-reconstituée de 2 ml



#### Doses de rappel / additionnelles :

### Pfizer Comirnaty BIVALENT

capuchon gris  
Fiole multidoses de 2,5 ml



30 ans et plus

#### Primovaccination :

### Pfizer Comirnaty RÉGULIER,

capuchon mauve, Fiole multidoses non-reconstituée de 2 ml



Ou

### Moderna Spikevax RÉGULIER (0,20mg/ml)

capuchon rouge, Fiole multidoses de 5 ml



#### Doses de rappel / additionnelles :

### Moderna Spikevax BIVALENT

(0,10 mg/ml),  
capuchon bleu roi / contour d'étiquette  
vert, avec mention souches « 0/0 »  
Fiole multidoses de 2,5 ml



Ou

### Pfizer Comirnaty BIVALENT

capuchon gris  
Fiole multidoses de 2,5 ml





## Vaccin à protéine recombinante avec adjuvant

### NOVAVAX (Nuvaxovid)

Fioles multidoses de 5 ml (10 doses)

**Posologie :**

**18 ans et plus :**

0,5 ml IM

**Conservation :**

**2 et 8°C :** ad péremption

**Fiole ouverte:** ad 6 heures (2-8°C).

## Notes additionnelles – Conservation :

- **Fioles périmées :**
  - Valider la date de péremption réelle au SiPMi avant de jeter (prolongation possible).
  - Pour les Pfizer Comirnaty pédiatrique : la date d'expiration se calcule en comptant 12 mois après la date de fabrication écrite sur la fiole. Valider au SiPMi avant de jeter (prolongation possible).
- Tous les diluants (produits Pfizer) doivent être conservés entre 2-8°C ou à T° pièce.
- Un vaccin décongelé ne peut pas être remis au congélateur, sauf si indications contraires de la DSP.