

Vaccination contre la COVID-19 au Nunavik (MAJ 2023-08-02)

*Consulter le PIQ pour indications, contre-indications, précautions, calendrier d'administration et intervalles à respecter.
En tout temps, les directives contenues dans le PIQ prévalent sur ce document.*

SAISIE AU REGISTRE VACCINAL, GESTION DES PERTES ET RAPPORT DE VACCINATION

- La saisie au registre vaccinal doit être complétée maximale 48hrs suivant l'administration.
- L'inventaire physique des fioles de vaccins COVID-19 doit être effectué minimalement 1x / semaine.
- Toute perte de fioles non-entamées doivent être déclarée (Ex : délai de conservation au réfrigérateur dépassé, fiole expirée, BCF, etc.).

MANIFESTATIONS CLINIQUES INHABITUELLES

Toute MCI doit être déclarée via le formulaire AH-728 (envoyer à alexandra.asselin.rr17@ssss.gouv.qc.ca).

NOTES ADDITIONNELLES – CONSERVATION DES VACCINS:

- **Fioles périmées :**
 - Valider la date de péremption réelle au SiPMi, avec votre conseiller ou avec la pharmacie avant de jeter (prolongation des dates d'expiration par le fabricant possible).
 - Pour **tous les produits Comirnaty de Pfizer** : la date d'expiration se calcule en comptant 18 mois après la date de fabrication écrite sur la fiole.
- Les diluants doivent être conservés entre 2-8°C ou à T° pièce.
- Un vaccin décongelé ne peut pas être remis au congélateur, sauf si indications contraires de la DSP.

Vaccins à ARNm

PFIZER		MODERNA
<p>COMIRNATY 5-11 ans BIVALENT *</p> <p>BA.4-5 10 µg / dose</p> <p>Capuchon ORANGE Fiole de 2 ml (10 doses)</p>		<p>COMIRNATY BIVALENT *</p> <p>BA.4-5 30 µg/dose</p> <p>Capuchon GRIS Fiole de 2ml (6 doses)</p>
<p>SPIKEVAX BIVALENT *</p> <p>0,10mg/ml - 25µg souche originale + 25µg souche BA.1 ou BA.4 + BA.5 /dose</p> <p>Capuchon BLEU -- étiquette contour GRIS (BA.4-5) ou Capuchon BLEU – étiquette contour VERT (BA.1) Fiole de 2,5 ml (5 doses)</p>		
Posologie	<p>5 à 11 ans : 0,2 ml IM</p> <p>*Voir le PIQ pour les indications de doses de rappel.</p>	<p>12 ans et plus : 0,3 ml IM</p> <p>*Voir le PIQ pour les indications de doses de rappel.</p>
	<p>6 mois à 11 ans : 0,25 ml IM</p> <p>12 ans et plus : 0,5 ml IM</p> <p>*Voir le PIQ pour les indications de doses de rappel.</p>	
<p>Attn! - Privilégier le Comirnaty pour les personnes de 12 à 29 ans en raison du risque de péricardite / myocardite qui pourrait être moindre.</p>		
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> • JAMAIS à -20c • 2 et 8°C : 10 semaines sans dépasser la date de péremption. • Fiole ouverte: conservation ad 12 heures (2-8°C) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • -25 et -15°C : ad péremption. • 2 et 8°C: 30 jrs. • Fiole ouverte: conservation ad 24 heures (2-8°) 	
Dilution	Reconstituer avec 1,3 ml de diluant fourni.	Sans dilution
	Sans dilution	

*Notez que le PIQ autorise toujours l'administration des formes monovalentes en primovaccination, de façon interchangeable lorsque les formes bivalentes ne sont pas disponibles.

Vaccin à protéine recombinante avec adjuvant

NOVAVAX (Nuvaxovid)

Fioles multidoses de 5 ml (10 doses)

Posologie :

12 ans et plus :

0,5 ml IM

Attn! – Privilégier les vaccins COVID-19 ARNm, sauf chez les personnes qui ont une contre-indication aux vaccins COVID-19 ARNm ou qui refusent ces vaccins.

Conservation :

2 et 8°C : ad péremption

Fiole ouverte: ad 6 heures (2-8°C).